

BIỆN PHÁP SỬ DỤNG THUỐC BVTV PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN MÍA GIAI ĐOẠN MÍA TỪ MỌC MẦM ĐẾN 6 THÁNG TUỔI

1. Thành phần và đặc điểm gây hại:

- Việt Nam có 9 loại sâu đục thân hại mía phổ biến.
- Vùng mía NASU có 2 loại sâu đục thân chính lá : Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu và sâu đục thân 4 vạch đầu vàng.



Mía héo nõn khi còn nhỏ
Sâu đục thân 5 vạch đầu nâu



Lá mía lốm đốm trắng
Sâu đục thân 4 vạch đầu vàng

2. Sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất lưu dẫn như: USA Grago, Yamida (*Imidacloprid*); Goldra (*Thiamethoxam*); Dupont (*Chlorantraniliprole*)...




Thuốc có tác dụng:

- Phòng trừ sâu đục thân hại mía.
- Hạn chế sự phát sinh, phát triển của sùng trắng đục gốc mía.
- Kiểm soát rệp xở bông trắng sớm.

3. Phương pháp phun:

- Pha thuốc vào bình phun theo đúng liều lượng ghi trên bao bì.
- Mang bình phun và đi dọc theo từng hàng mía;
- Khi gặp các điểm thấy hoặc nghi có sâu hại, tiến hành mở vòi phun để tiêu diệt sâu, kết hợp phun rệp xơ bông trắng nếu có.
- Sau khi phun xong, tắt vòi, tiếp tục di chuyển và làm tương tự đến khi đi hết ruộng mía.



4. Ưu điểm phun thuốc trừ sâu hại mía theo phương pháp phun điểm:

- Giảm lượng thuốc sử dụng;
- Tiết kiệm chi phí;
- Ít ảnh hưởng đến thiên địch ăn sâu;
- Hiệu quả phòng trừ cao.

- Chỉ phun xung quanh điểm thấy hoặc nghi có sâu.
- Đi chậm, quan sát kỹ, dọc theo từng hàng mía, chú ý không bỏ sót.
- Thực hiện ít nhất 1 tháng/lần từ khi sâu bắt đầu xuất hiện.